~~Du~~ Opération de la Seime

Chirurgie Vétérinaire

n.° 43

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 38 n° 88 (A à B)

Opération de La Seime

Cette opération consiste dans la destruction ou dans l'enlevement de la paroi de l'ongle qui se trouve divisée, division qui constitue la maladie désignée sous le nom de seyme.

Il est deux moyens de la pratiquer, par le feu, ou par l'instrument tranchant. Le premier étant employé, c'est de la suppuration et de la chute de l'escharre des parties brulées que dépend la réunion des parties divisées et parconséquent le succès qu'on attend, et quant au second, l'effet désiré tient simplement à une nouvelle réproduction de la portion retranchée du sabot.

Le cautere actuel est la seule méthode prescrite par les auteurs en maréchallerie, et parconséquent la seule pratiquée par les maréchaux, mais il ne peut remedier qu'aux seimes superficielles, il est absolument insuffisant lorsqu'elles sont larges et profondes, et d'ailleurs ses effets sont

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 38 n° 88 (6)

souvent accompagnés de douleur et de
chaleur.

Lorsque cette maladie est benigne;
que sa cause est légere, on pratique —
l'opération dès que l'occasion s'en présente;
mais si l'animal souffre beaucoup, s'il y
a inflammation, si le sujet est délicat —
&c. Il est essentiel d'y préparer la partie
par des substances relachantes et —
calmantes, et d'y disposer le malade
par la saignée, des breuvages et des —
lavemens tempérans, et si l'on soupçonne
quelque vice dans les humeurs, si la
cause du mal est due par exemple
à l'action d'un virus psorique, il faut
nécessairement débuter par un usage
méthodique des dépuratoires et des
purgatifs.

abbatez la parois le plus qu'il
vous sera possible, parez la sole et la
fourchette jusqu'à la partie demi vive,
attachez un fer très mince et peu
couvert; si la seime est située sur le —
quartier ou sur le talon, tronquez
l'éponge répondant à la partie malade;
l'éponge tronquée doit être mince et
coupée en biseau, il ne faut pas aussi
qu'elle dépasse la seime, elle doit —
au contraire être un travers de doigt
plus en arriere afin de découvrir le mal
et de faciliter des lors l'opération &c.

les pansements. Si elle est située en Pince, et qu'elle constitue ce qu'on appelle Soie ou pied de Boeuf, faites un ample sifflet et mettez un feu tronqué dans cette partie du pied, tel est celui destiné aux extrémités postérieures des Chevaux qui forgent, faites le poil autour de la couronne, assujettissez l'animal d'une maniere quelconque, souvent on l'opere à la main à la faveur d'un torche néz.

Armez vous d'un cautere essiforme que vous aurez fait chauffer jusqu'au point de rougir (voyez la cauterisation). appliquez le transversalement sur la partie superieure de la couronne directement à la naissance de la division, laissez sejourner le cautere jusqu'à ce que la peau # soit brulée et que les parties ignées ayent pénétré le tissu cellulaire, placez une seconde S de feu directement sur la division à un travers de doigt de la précédente, brulez jusqu'au tissu feuilleté.

Nous ne pouvons nous dispenser d'observer ici que les nécessité de la forme de cette espece de cautere n'est pas évidente, elle a été sans doute imaginée pour croiser la Seime dans plusieurs sens, mais c'est précisément ce que cet instrument ne fait pas et ne peut faire, il seroit long et inutile d'en dire les raisons

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

En pareil cas nous nous sommes toujours
préférablement et très utilement servi —
d'un cautere représentant un V. —
consonne.

Nous appliquons celui cy sur le —
Bord superieur de la paroit, ensorte
que les extrémités des jembages de
cette lettre répondent directement sur
la ligne de la couronne et que la —
réunion des deux branches de cet V. —
entre dans les division de l'ongle; —
nous faisons réchauffer ce même
cautere et nous l'appliquons de —
nouveau, mais dans un sens contraire
et de maniere que les extremités des
jambes du second cautere rencontrent
les extremités de celles de la premiere
consonne tracée, alors les angles —
aigus répondent a la division de —
l'ongle et les angles obtus sont —
traversés par le bord superieur de la
paroit, c'est adire, par la couronne.
la premiere application du cautere —
doit etre plus forte et plus continuée
que la seconde, dans l'une nous avons
toute l'Epaisseur du biseau de la paroit
a pénétrer, dans l'autre nous n'avons
a agir que sur les teguments, mais —
tournez et panchez legerement la —
main en contre bas dans le tems de
la premiere de ces cauterisations, afin

de Bruler également le sabot qui est attendu son biseau beaucoup plus épais a quelques lignes de son bord supérieur.

Cette opération peut etre également faite avec un simple Cautere a lame Courte et droite que vous placerez et dirigerez demanière a décrire ces doubles ◊, vous procurerez une Escharre dela peau et de l'ongle et C'est précisement la fin que vous devez vous proposer et alaquelle vous arriverez plus surement et plus promptement que par la voye du Cautere cultiforme.

L'opération dela seime par l'instrument tranchant consiste dans l'enlevement total des parties divisées de l'ongle, Armez vous d'une renette bien tranchante, incisez la paroit de haut en bas dans toute son épaisseur et jusqu'aux feuillets a un travers de doigt de la division que forme la maladie dont il s'agit. pratiquez en autant au coté opposé, demaniere que la seime se trouve alors située a distances égales et marche parallellement aux incisions pratiquées, prenez un bistouri, achevez d'inciser les feuillets que la Renette n'a pu atteindre, incisez aussi la couronne d'une rainure a l'autre, faites parcourir la pointe du bistouri entre le biseau et le bourlet, si la seime n'est pas complete

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

achevéz de la séparer par quelques coups de renette, et même avec le bistouri s'il en est besoin. saisissez avec le bec de corbin l'une des portions de la parois separée du coté de la couronne, n'arrachez pas cette partie, mais separéz la en la disséquant d'une main amesure que vous agiréz de l'autre avec la renette, pratiquéz la même manoeuvre a l'autre portion de l'ongle, nétoyéz la playe de toutes les portions de parois qui peuvent y etre restées, ou des feuillets macerés et pourris que vous y rencontrerez, mais si l'os du pied est soulevé et présente une saillie longue et étroite qui remplisse la seime, ainsi qu'il arrive asséz souvent a la soye, alors bruléz cette partie qui saillit dans toute son étendue a l'effet d'obtenir une exfoliation asséz forte pour égaliser la surface de l'os. toute l'attention a avoir ici est d'éviter d'échauffer la paroi et les feuillets, pour cet effet deffendéz ces parties en les garantissant d'une lame de fer que vous placeréz et que vous feréz maintenir par un aide, sur chacun des cotés de la paroi divisée, ayéz encore soin de faire refroidir ces lames dans l'eau fraiche a mesure qu'elles séchaufferont.

Ces opérations faites, procedéz

au pansement et a l'application de l'appareil convenable.

Dans le cas de la Cautérisation de l'ongle employéz un suppuratif quelconque, mettéz autour du pied un Cataplasme émollient.

Dans la circonstance de l'amputaōn de la seime, remplisséz le vuide de la playe par des plumaceaux imbibés d'essence de terrebentine, et enveloppéz le pied d'etoupes chargées d'onguent populeum.

Si vous avéz été nécessité de Cautériser l'os du pied, ayéz recours a la teinture d'aloes, couvréz et enveloppéz le tout d'un cataplasme anodin, saignéz et donnéz des lavements émollients, mettéz l'animal au Regime et a l'usage des substances tempérantes et calmantes.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE